

➤ **О клинических симптомах, требующих незамедлительного обращения к врачу-акушеру-гинекологу**

Симптомы, которые должны стать поводом для немедленного обращения к врачу акушеру-гинекологу во время беременности

- **Кровотечение из влагалища.** Любое кровотечение из влагалища во время беременности, особенно если оно сопровождается болями или схватками, требует немедленного обращения к врачу.
- **Сильные боли в животе или пояснице.** Если у вас возникают сильные боли в животе или пояснице, это может быть признаком различных осложнений беременности, таких как предродовые схватки, преждевременное отсоединение плаценты или другие проблемы. Обратитесь к врачу сразу.
- **Выделения из влагалища, отличные от нормальных.** Если у вас возникают выделения из влагалища, которые отличаются по цвету (например, розовые, кровянистые или зеленоватые), запаху или консистенции от обычных выделений, это может быть признаком инфекции или другой проблемы. Обратитесь к врачу для оценки.
- **Отеки в руках, ногах или лице.** Если отеки становятся резко выраженными, особенно в сочетании с головной болью, затрудненным дыханием и изменением зрения, это может быть признаком преэклампсии или других серьезных проблем. Обратитесь к врачу.
- **Сильная головная боль или изменение зрения.** Эти симптомы могут быть признаком преэклампсии, что требует немедленного вмешательства.
- **Сильные схватки.** Если у вас возникают сильные болевые схватки раньше срока или если они сопровождаются кровотечением или изменением выделений из влагалища, обратитесь к врачу.
- **Обильные жидкие выделения.** Если у вас произошел разрыв плодных оболочек («отошли воды») и воды вытекают из влагалища, обратитесь к врачу, даже если нет схваток.
- **Боли при мочеиспускании.** Боли, жжение, а также необычные выделения при мочеиспускании могут быть признаками инфекции мочевыводящих путей.
- **Снижение движений ребенка.** Если вы ощущаете снижение активности вашего ребенка в утробе, это может быть тревожным признаком. Обратитесь к врачу для оценки состояния ребенка.
- **Сильная тошнота и рвота.** Сильная тошнота и рвота, которые могут привести к обезвоживанию, требуют медицинской помощи.
- **Сильные аллергические реакции.** Если у вас возникают сильные аллергические реакции, такие как отек горла, затрудненное дыхание или сыпь, немедленно обратитесь к врачу.